

殺虫・殺ダニ剤

畑が変わる サイモディス

優れた防除効果による

「うれしい変化」と「新しい驚き」

を実感してください。



 **サイモディス® DC**
PLINAZOLIN® technology

syngenta.

シンジェンタ ジャパン株式会社

農薬をご使用の際には、ご購入先、または当社ウェブサイトなどで最新の登録内容をご確認ください。

®はシンジェンタ社の登録商標

幅広い害虫を長期間、同時に防除します。*

- アザミウマ類、ハダニ類、ハマキムシ類、ゴマダラカミキリ、カメムシ類に卓効
- ハダニ類に1か月以上の長期残効
- DC製剤が優れた付着性を実現し、防除効果に貢献
- ミツバチ、マルハナバチは散布翌日から導入可能

※ 作物によって適用病害虫は異なります。

■ 適用病害虫の範囲及び使用方法 * 本剤及びイソシクロセラムを含む農業の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	総使用回数*		使用方法
かんきつ	ミカンハダニ アザミウマ類 ゴマダラカミキリ カメムシ類 チャノホコリダニ ミカンサビダニ ミカンハモグリガ	5000倍	200～700ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内		散布
なし	ハダニ類 ニセナシサビダニ カメムシ類			収穫前日 まで	1回		
りんご	ハダニ類 カメムシ類 ハマキムシ類 キンモンホソガ						
核果類 (ももを除く)※1	ハダニ類						
もも	ハダニ類 カメムシ類 モモハモグリガ ハマキムシ類	2500～ 4000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内		
だいこん	キスジノミハムシ カブラハバチ類 コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ						
鱗茎類 (根物)	アザミウマ類 ネギハモグリバエ	2500倍			本剤: 2回 以内	イソシクロ セラム剤: 4回以内 (灌注は1回 以内、株元 灌注は1回 以内、散布は 2回以内)	灌注
鱗茎類 (葉物)	ネダニ類				500倍	セル成型育苗トレイ 1箱またはペーパー ポット1冊(約30× 60cm、使用土壌約 1.5～4ℓ)当り0.5ℓ	
	ネダニ類	5000倍	0.3ℓ/m ²	収穫21日 前まで	本剤: 1回		株元灌注
きゅうり	アザミウマ類 トマトハモグリバエ ハダニ類 コナジラミ類 ウリノメイガ	2500倍	100～300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内		散布
うり類(成熟、 ただし、すいか、 メロンを除く)※2	ハダニ類						
すいか メロン	ハダニ類 アザミウマ類 トマトハモグリバエ コナジラミ類 ウリノメイガ						

*1 核果類(ももを除く): おうとう、うめ、すもも、あんず、ネクタリンなど

*2 うり類(成熟、ただし、すいか、メロンを除く): かぼちゃ、まくわうりなど

■ 使用上の注意事項及び被害防止方法(抜粋)

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性の強い農薬との混用をさけてください。
- 本剤は植物への浸透移行性がないため、葉裏にもよくかかるように散布してください。
- 害虫抵抗性の発達を防ぐため過度の連用を避け、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせで使用してください。
- 果樹のハダニ類に対して使用する際は、抵抗性の発達を防ぐためできるだけ年1回散布とし、作用性の異なる他の殺ダニ剤との輪番で使用してください。
- カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用后14日間は入水しないでください。
- 蜜に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にからないようにしてください。
- マルハナバチ等に対して影響があるので、マルハナバチ等の巣箱及びその周辺にからないようにしてください。
- 受粉促進を目的としてマルハナバチ等を放飼中の施設や果樹園などでは、散布直後から1日後まではハチを移動させるか果門を閉じてください。
- アレルギー性皮膚反応を起こすおそれがあります。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にからないようにしてください。
- 農薬使用者への被害防止方法
[薬剤調製者・散布者]登録に係る全ての作物:保護眼鏡、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣
- 蜜蜂への被害防止方法
a. きゅうり、うり類(成熟、ただし、すいか、メロンを除く)、すいか、メロン、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、花き類・観葉植物(きくを除く)、きく:閉鎖系施設(側面及び上面が被覆されており、密閉可能な施設)での使用に限る。
b. かんきつ、なし、りんご、核果類(ももを除く)、もも:閉鎖系施設(側面及び上面が被覆されており、密閉可能な施設)で使用する、または発芽(萌芽)~落花(開花終了)まで使用しない。
- 危険物第四類第三石油類に属するので火気には十分注意してください。

PLINAZOLIN® technology

プリナゾリン®は、サイモディスDCの有効成分イソシクロセラムの商標名です。GABA作動性塩化物イオン(塩素イオン)チャネルアロステリックモジュレーター(殺虫剤分類:30)のイソオキサゾリン系に属します。



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
トマト ミニトマト	アザミウマ類 トマトハモグリバエ トマトサビダニ コナジラミ類 オオタバコガ	2500倍	100~300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布
なす	アザミウマ類 トマトハモグリバエ ハダニ類 チャノホコリダニ コナジラミ類 オオタバコガ					
ピーマン	アザミウマ類 ハダニ類 チャノホコリダニ コナジラミ類 オオタバコガ					
カリフラワー	コナガ アオムシ アザミウマ類	4000倍	100~300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布
ブロッコリー	ハイマダラノメイガ ヨトウムシ オオタバコガ ウワバ類					
結球あぶらな科 葉菜類 (はくさい、 キャベツを除く)	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ オオタバコガ	4000倍	200~400ℓ /10a	収穫7日 前まで 但し、メキャベツ にあては本葉 切り落とし開始 の前日まで	1回	散布
キャベツ	アザミウマ類 ウワバ類					
はくさい	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ オオタバコガ					
レタス	キスジノミハムシ カブラハバチ類	2500倍	100~200ℓ /10a	収穫3日 前まで	2回以内	散布
茶	ナモグリバエ オオタバコガ					
茶	チャノキロアザミウマ チャノミドリヒメコバ カンザワハダニ チャノコクモンハマキ チャノホソガ	2500倍	200~400ℓ /10a	摘採7日 前まで	1回	散布
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)	ハダニ類	2500倍	100~200ℓ /10a	発生初期	2回以内	散布
きく	アザミウマ類 ハダニ類	2000~ 2500倍				


サイモディスDCの蜜蜂への被害防止方法

a.b. 果菜類および花き類・観葉植物、果樹類(施設栽培)

ミツバチが中に入れない閉鎖系施設での使用に限る



b. 果樹類(露地栽培)



●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●薬剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器、空袋等は園場などに放置せず適切に処理してください。

最新の登録情報は
こちら



シンジェンタ ジャパン株式会社
〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX21階
www.syngenta.co.jp

